

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря 2015 г.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Европе
продолжает расти

В 2014 г. в Европе было зарегистрировано самое
большое количество новых случаев ВИЧ-инфекции за
весь период после начала их ежегодной регистрации





Жужанна Якаб
Директор Европейского
регионального бюро ВОЗ

Несмотря на все усилия по предотвращению ВИЧ-инфекции, в 2014 г. в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 142 000 новых случаев ВИЧ-инфекции – наибольшее количество за весь период после возникновения этой угрозы для общественного здоровья, что вызывает серьезную тревогу.

В условиях, когда уже накоплен большой объем данных по методам профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией, включая новые руководства по ее лечению, мы призываем европейские страны принять решительные меры, чтобы раз и навсегда обуздать эпидемию ВИЧ-инфекции.

В 2014 г. в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 142 000 случаев инфицирования ВИЧ – наивысший годовой показатель с начала 1980-х годов




Кумулятивное число новых диагнозов ВИЧ-инфекции в странах ЕС/ЕЭЗ и в других странах Европейского региона ВОЗ, 1984-2014 гг.



Рост эпидемии ВИЧ-инфекции в Регионе, главным образом, обусловлен эпидемиологической ситуацией в его восточной части, где количество новых случаев ВИЧ-инфекции за последнее десятилетие более чем удвоилось

Частота инфицирования ВИЧ с разбивкой по году постановки диагноза, Европейский регион ВОЗ, 2005-2014 гг.




Нет данных из Боснии и Герцеговины, Туркменистана и Узбекистана.



Восток: Показатели передачи ВИЧ гетеросексуальным путем увеличиваются, а показатели передачи ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков по-прежнему остаются существенными

Частота инфицирования ВИЧ с разбивкой по путям передачи и году постановки диагноза в восточной части Европейского региона ВОЗ, 2004-2014 гг.




Нет данных из Российской Федерации, Туркменистана и Узбекистана.



ЕС/ЕЭЗ: большинство новых случаев ВИЧ-инфекции было выявлено среди мужчин, имеющих секс с мужчинами


ЕС/ЕЭЗ: большинство новых случаев ВИЧ-инфекции было выявлено среди мужчин, имеющих секс с мужчинами



Данные из Италии, Испании, Польши и Эстонии исключены из-за непоследовательной или неполной отчетности по путям передачи ВИЧ в течение рассматриваемого периода.



Две трети всех новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируются среди коренных европейцев, а одна треть – среди мигрантов




- Коренное население (люди происхождения из страны отчетности)
- Европейские мигранты (люди происхождения из других Европейских стран, не из страны отчетности)
- Другие мигранты (люди происхождения из стран вне Европейского региона ВОЗ)



Количество мигрантов с диагнозом ВИЧ-инфекции резко сократилось за последнее десятилетие

Новые случаи ВИЧ-инфекции среди коренных жителей, европейских мигрантов, других мигрантов, Европейский регион ВОЗ, 2005-2014 гг.



Данные из Болгарии, Италии, Испании, Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Туркменистана и Эстонии исключены из-за непоследовательной отчетности или неполной отчетности о стране рождения и регионе происхождения в течение рассматриваемого периода.



Вопросы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди беженцев и мигрантов продолжают оставаться приоритетными

Вследствие социального отчуждения беженцы и мигранты подвергаются большему риску заражения ВИЧ-инфекцией.

ВОЗ настоятельно призывает все европейские страны предлагать всем беженцам и мигрантам, независимо от их правового статуса, услуги в области тестирования на ВИЧ, а также профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.




Такой подход также является самым надежным и безопасным способом защиты коренного населения от ВИЧ-инфекции.

Д-р Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ




Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции является одним из препятствий на пути ликвидации СПИДа

Новые диагнозы ВИЧ-инфекции в разбивке по уровню CD4-лимфоцитов на мм³ на момент постановки диагноза и путям передачи вируса, Европейский регион ВОЗ, 2014 г.



Рост эпидемии ВИЧ-инфекции в Регионе, главным образом, обусловлен эпидемиологической ситуацией в его восточной части, где количество новых случаев ВИЧ-инфекции за последнее десятилетие более чем удвоилось


Частота новых случаев СПИДа с разбивкой по географическим зонам и году постановки диагноза, Европейский регион ВОЗ, 2005-2014 гг.



Нет данных из Боснии и Герцеговины, Российской Федерации, Сан-Марино, Узбекистана и Швеции.





Две трети случаев СПИДа в ЕС/ЕЭЗ были диагностированы на момент выявления ВИЧ-инфекции или вскоре после этого



Новые глобальные руководства по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции направлены на улучшение качества услуг в этой области

- **АРТ** следует начинать у **всех людей, живущих с ВИЧ.**
- **Раннее начало АРТ** приносит пользу для здоровья людей, получающих лечение, и способствует предотвращению передачи ВИЧ.
- **Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции (ДКП)** рекомендуется для людей, подвергающихся повышенному риску заражения ВИЧ, в целях защиты от ВИЧ-инфекции
- **Программы раннего и целенаправленного тестирования на ВИЧ** следует расширить, чтобы сделать эту услугу здравоохранения более доступной.



Стратегия достижения цели "Ноль": предстоящий план действий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ в 2016-2021 гг.

Видение: Европейский регион ВОЗ, где достигнута цель «Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль смертей вследствие СПИДа, ноль дискриминации в отношении ЛЖВ» и где ЛЖВ могут жить долгой и здоровой жизнью.

Цели:

- **90%** людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), знают свой ВИЧ-статус
- **90%** людей с диагнозом ВИЧ-инфекции получают АРТ
- У **90%** ЛЖВ, получающих АРТ, достигнута вирусная супрессия
- Сокращение на **75%** новых случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе среди ключевых групп населения
- **Ноль** новых случаев ВИЧ-инфекции среди грудных детей



Региональный план действий по борьбе с ВИЧ-инфекцией будет формироваться на основе следующих 5 стратегических направлений (СН) деятельности в рамках Глобальной стратегии сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 2016-2021 гг.

- СН-1: Стратегическая информация, способствующая повышению **целенаправленности и подотчетности** деятельности
- СН-2: Меры по усилению **воздействия** проводимых мероприятий
- СН-3: Обеспечение соблюдения принципа **справедливости**
- СН-4: Финансирование в целях **повышения устойчивости**
- СН-5: Инновации в целях **ускорения**



Региональное консультативное совещание по Глобальной стратегии сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 2016.-2021 гг.



Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря 2015 г.

Ликвидация СПИДа в Европе

- Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции
- Охват услугами здравоохранения лиц, подвергающихся повышенному риску
- Расширение масштабов целенаправленного тестирования на ВИЧ
- Оказание лечебной помощи всем людям, живущим с ВИЧ
- Предложение **всем** нуждающимся услуг по тестированию на ВИЧ, а также по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

www.euro.who.int/aids

